



**ТИЗЕРЫ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ
НА АУКЦИОН**

АСТАНА 2025

СПИСОК МЕСТОРОЖДЕНИЙ

№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	ОБЛАСТЬ
1	Терсайрык р.	ВКО
2	Каскабулак	АБАЙ
3	Мамонтовское	ВКО
4	Каиндинское	АКТОБЕ
5	Геофизическое 3	АКТОБЕ
6	Геофизическое 4	АКТОБЕ
7	Дрожиловское	КОСТАНАЙ
8	Жездинское	УЛЫТАУ
9	Промежуточное	УЛЫТАУ
10	Жаксы (уч. 3,5)	АКМОЛА
11	Тогай-1	КАРАГАНДА
12	Тогай-2	КАРАГАНДА
13	Биркси	КАРАГАНДА
14	Июльское	АКТОБЕ
15	Жила 31	АБАЙ
16	Ново-Березовское	ВКО
17	Болдыколь	ПАВЛОДАР
18	Загадка уч.(Бакырчикское рудное поле)	АБАЙ
19	Березовское	ВКО
20	Батамшинское	АКТОБЕ
21	Шелектинское	АКТОБЕ
22	Чуулдак уч.1	АКТОБЕ
23	Чанды-Булак	ВКО
24	Большая Буконь	ВКО

№	НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ	ОБЛАСТЬ
25	Миялы	АБАЙ
26	Харьковское (участки 1, 2, 3, 4)	УЛЫТАУ
27	Акшоки III	УЛЫТАУ
28	Щербаковское	АКТОБЕ
29	ТМО Шламонакопитель №1	ВКО
30	ТМО Шламонакопитель №2	ВКО
31	Челак-Карасу	КАРАГАНДА
32	Летовочная россыпь	СКО
33	Восточно-Шандашинское	АКТОБЕ
34	Ново-Шандашинское	АКТОБЕ
35	Кзыл-Каинское	АКТОБЕ
36	Кокпектинское	АКТОБЕ
37	Богембай	АКМОЛА
38	Ушбулак	ВКО
39	Месторождение 94	ЗКО
40	Майбулак Восточный	ЖАМБЫЛ
41	Северо-Леонидовское	КОСТАНАЙ
42	участок Шаханский	КАРАГАНДА
43	Березовское	АКМОЛА
44	Шарык	АБАЙ
45	Белогорское	ВКО
46	Сеным	ЖЕТЫСУ
47	Сугатовское	ВКО

В неотработанных блоках остались запасы со средним содержанием золота 2,19 г/т, серебра 35,14 г/т, отвечающие мелкому месторождению. Месторождение слабо разведано на флангах и особенно на глубину. Месторождения слабо разведано на флангах и особенно на глубину. Запасы в перспективе могут быть увеличены в несколько раз.

_____ - река

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	C1 – 61,1кг.; C2 – 28,8 кг	-

Местоположение: Месторождение Каскабулак расположено в Абайской области в 77 км к востоку от г. Аягоз

Краткая геологическая характеристика: Рудовмещающий комплекс пород представлен вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями верхнего ордовика-нижнего силура, перекрытыми терригенно-карбонатной толщей верхнего силура. Мезозойские отложения развиты в межгорных впадинах и на склонах; представлены они неогеновыми глинами и четвертичными образованиями делювиально-пролювиального генезиса.


Месторождение представлено двумя залежами окисленных руд: зона Штокверк и зона Основная. Зона Штокверк представляет собой плащевидную в плане залежь протяженностью 320 м, при ширине от 20 до 60 м, полого (под углами до 30°) падающую к северо-западу. Зона Основная имеет в плане лентовидную форму; длина ее составляет около 350 м, при средней ширине 5-20 м, с раздувом в средней части до 90 м. Залегание ее так же пологое (5-20°), падение юго-западное.

Основным полезным компонентом в рудах является золото. Незначительные примеси серебра (0,1-1,65 г/т) и меди (0,01-1,0 %) из-за малых содержаний промышленного значения не имеют. Мышьяк в пробах не обнаружен. Сера в окисленных рудах представлена сульфатной формой.

Рудные тела зон Штокверк и Основная характеризуются средними углами падения от 15 до 30°. Морфологически они представляют собой плащевидные залежи простой формы мощностью 2-10 м с единичными раздувами и пережимами. Показатели потерь и разубоживания приняты по аналогии с подобными объектами в регионе и составляют 6,0 % и 8,5% соответственно. Коэффициенты вскрыши при открытой добыче составят: по зоне Штокверк 1,24 м³/т, по зоне Основная 1,79 м³/т.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	C2 – 174,2 кг	-



 - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Каскабулак), для дальнейшего выставления на аукцион

 - отозванная лицензионная территория ТОО «Эмикон». Лицензия №107-EL от 28.05.2019г на разведку ТПИ. Лицензия отозвана в 2021 году, акт обследования отсутствует.

 - лицензии на ГИН

Местоположение: в северо-восточной части Зырянского рудного района, располагаясь на восточном крыле Ревнюшинской антиклинальной структуры.

Краткая геологическая характеристика: Площадь месторождения характеризуется широким распространением осадочных и вулканогенных отложений нижнекаменноугольного возраста, развитием синвулканических и поствулканических интрузивных образований, разрывных нарушений различного направления.

На месторождении выделены две рудные зоны: Восточная и Западная.


Восточная кварц-жильная зона кулисообразно, с перерывами до 70м простирается к северо-западу по азимуту 330-340°. Окварцевание в зоне носит существенно прожилковый характер. Участками жилы образуют «лестничный тип» со связующими «сетчатыми прожилками». Это линейно вытянутые в плане и разрезе пологозалегающие под углами 25-45° жилы мощностью до 40 см. По простиранию длина этих жил достигает 125м, по падению до 80 м.

Западная зона залегает в афировых андезитовых порфиритах с «корнями» в эндоконтакте кварцевых диоритов.

Окварцевания в этой зоне прожилковое и представлено следующими типами жил: крутопадающие, сетчатые, ветвящиеся, лестничные.

Рудная минерализация зоны представлена золотом, серебром, сульфидами свинца, цинка, меди. Коспоненты локализуются в гнездах, вкрапленники, примазки.

Все рудные тела месторождения не имеют естественных границ и оконтурены по данным опробования. Содержание золота составляют от 1,0 до 253 г/т, серебра от 0,1 до 968 г/т.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Мамонтовское), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН
-  - река


Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	A+B+C1 – 68,0 кг; C2 – 803,0 кг.	-

Местоположение: в Мугоджарском районе Актюбинской области, в 700 м северо-западнее поселка Каинды на правом и левом берегах одноименной реки.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к средней части восточного крыла Карасайской антиклинали, сложенной аплитогнейсами, гранитогнейсами, биотитовыми гнейсами и графитистыми кварцитами ортокарасайской свиты докембрия. Простираение пород субмеридиональное, падение восточное под углом 60-80°. Отмечаются линзы пегматоидов и секущие дайки плагиогранит-порфиров. Широко развита кора выветривания мощностью первые метры. Кора перекрыта глинисто-песчанисто-щебенистыми отложениями четвертичного возраста мощностью 1-1,2м.

Выявлено шесть залежей асбестоносных гипербазитов, представленных оталькованными и антофиллитизированными метасульфидными. Размеры залежей 75 x 30 x 30 - 120 x 30 x 50 м. Форма залежей линзообразная, изометрично-округлая и трубообразная. Контакты с вмещающими породами четкие, извилистые. Руды звездчатой структуры, массивные, состоят из талька, волокнистого и жесткого антофиллита, карбоната и, в меньшей степени, актинолита, флогопита, вермикулита. Встречаются реликты серпентинита. Степень асбестизации увеличивается к висячему боку, а также к южному выклиниванию тел. Содержание волокна по залежам I и III класса +0,5 мм - 1,5-10%; по залежи II класса +0,5 мм - до 19,46%, +1,6 мм до 17,28%.



 - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Каиндинское), для дальнейшего выставления на аукцион

 - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
асбест	A+B+C1- 6,4 тыс.т, C2 – 0,2 тыс.т	-

Месторождение Геофизическое 3

Актюбинская область


5

Местоположение: находится в Мугоджарском районе Актюбинской области, в 15 км к востоку от месторождения Геофизическое I.

Краткая геологическая характеристика: Месторождения приурочены к северному периклинальному замыканию Карасайской антиклинали, сложенной метаморфическими породами южно-мугоджарской серии. Метаморфические породы мигматизированы, в них отмечаются секущие и согласные дайки гранитов и жилы кварца. Особенно крупные дайки порфировидного биотитового гранита развиты на месторождении Геофизическое III. Общее простирание вмещающих пород субмеридиональное, падение восточное под углом 40-80°. Дизъюнктивные нарушения сопровождаются окремнением, вермикулитизацией, оталькованием и др.

Состав вмещающих гипербазиты пород - биотитовые гнейсы с прослоями и линзами графитистых кварцитов и амфиболитов. На месторождении встречаются разности, обогащенные силлиманитом. Содержание графита в кварцитах 1-3%. Графит мелкочешуйчатый, равномерно распределенный на плоскостях сланцеватости.

На Геофизическом III выявлена одна залежь длиной 80 м при максимальной мощности 21 м. На глубину прослежена на 53 м и полностью не оконтурена. На Геофизическом IV выявлено две субпараллельных залежи. Более крупная (восточная) прослежена на 60 м, при средней мощности до 60 м. На глубине 20 м она выклинивается. Вторая залежь (западная) сечением 12 x 30 м, прослежена до глубины 10 м. Падение восточное под углом 65-70°. Форма линзообразная. Залежи имеют тальк-антофиллитовый состав с промышленным содержанием асбестового волокна. На месторождении содержание волокна для класса +0,5 мм от бортового до 18%, для класса +1,6 - 0,15-0,8%.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Геофизическое 3), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
асбест	A+B+C1- 1,4 тыс.т, C2 – 0,05 тыс.т	0,3 тыс.т

Месторождение Геофизическое 4

Актюбинская область


6

Местоположение: Месторождение находится в Мугоджарском районе Актюбинской области, в 15 км к востоку от месторождения Геофизическое I.

Краткая геологическая характеристика: Месторождения приурочены к северному периклинальному замыканию Карасайской антиклинали, сложенной метаморфическими породами южно-мугоджарской серии. Метаморфические породы мигматизированы, в них отмечаются секущие и согласные дайки гранитов и жилы кварца. Особенно крупные дайки порфировидного биотитового гранита развиты на месторождении Геофизическое III. Общее простирание вмещающих пород субмеридиональное, падение восточное под углом 40-80°. Дизъюнктивные нарушения сопровождаются окремнением, вермикулитизацией, оталькованием и др.

Состав вмещающих гипербазиты пород - биотитовые гнейсы с прослоями и линзами графитистых кварцитов и амфиболитов. На месторождении встречаются разности, обогащенные силлиманитом. Содержание графита в кварцитах 1-3%. Графит мелкочешуйчатый, равномерно распределенный на плоскостях сланцеватости.

На месторождении Геофизическое IV западная залежь тальк-антофиллитового состава обильно асбестизирована. Среднее содержание волокна класса +0,5 мм - 7%.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-сГеофизическое 4), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
асбест	A+B+C1- 0,5 тыс.т, C2 – 0,05 тыс.т	-

Месторождение Дрожиловское

Костанайская область


7

Местоположение: находится в Денисовском районе Костанайской области, в 50 км к юго-западу от железнодорожной станции Зааятская.

Краткая геологическая характеристика: Участок находится в ядре антиклинали, сложенной эффузивно-осадочными породами силурийского возраста. Оруденение приурочено к кварцево-жильным минерализованным зонам в хлоритовых сланцах.

На объекте выделены 2 типа руд: окисленные руды коры выветривания и первичные руды. Они слагают единые рудные тела, имеющие крутое юго-западное падение (65-700). Рудные тела характеризуются небольшими размерами по простиранию (первые сотни метров) и мощностями (1-4м). Золото в рудах распределено весьма неравномерно (коэффициент вариации 327%). Месторождение отнесено к 3-ей группе сложности геологического строения для целей разведки.

С поверхности кварцево-жильные минерализованные зоны участка откартированы с помощью канав и обнажений. На глубине золотосодержащие руды (окисленные и первичные) вскрыты наклонными скважинами, пройденными в период поисково-оценочных работ (2010-2012). Картировочным бурением в объеме 5900 п. м установлена нижняя ее граница коры выветривания (на глубине 12 м от дневной поверхности). Редкой сетью разведочных скважин изучены первичные руды. Общий выход керна по рудным зонам составил 97,6 %.



 - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-ие Дрожиловское), для дальнейшего выставления на аукцион

 - лицензии на ГИН


Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	C2 – 2100 кг	-

Местоположение: Месторождение находится 40 км к СВ от г. Карсакпай.

Краткая геологическая характеристика: Рудные залежи представляют согласные тела в толще конгломерат-песчаников, приуроченных к обеим крыльям Джездинской антиклинали, вдоль длинной оси которой рудные тела приурочены к крупным тектоническим разломам с сопряженными и оперяющими трещинами. Наблюдается повышенное содержание марганца в опущенном северо-восточном блоке месторождения по мере погружения блока на ЮВ вдоль оси Джездинской антиклинали, а также увеличение содержания марганца по вертикали в низах рудной зоны. Красноцветная молассовая формация средне-позднедевонского возраста. Красноцветная толща конгломерат-песчаников Уйтасской свиты Жакы-Конской серии верхнего франа, возможно, фамена. Аркозовая пачка розового и красноватого цвета, сложенная гравелитами и разнотерными песчаниками, реже, конгломератами и алевролитами. Общая мощность пород Уйтасской свиты 10-1200 м. Мощность аркозовой пачки до 150 м. Залегание пологое. Развита сеть тектонических разломов.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
марганцевые руды	A+B+C1-7491,8 тыс.т, C2 – 194 тыс.т	-



- территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Жездинское), для дальнейшего выставления на аукцион
- населённый пункт и буферная зона населенного пункта - п. Жезды
- лицензии на ГИН
- река
- железная дорога

Месторождение Промежуточное

Улытауская область

9

Местоположение: находится Жездинском районе, в 4,5 км к востоку от пос. Жезды и в 40 км к северо-западу от рудника Жезказган.


Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к пологопадающему (12-14°) юго-западному крылу Джездинской антиклинали, являющейся складкой второго порядка на юго-западном крыле Эскулинского брахиантиклинального поднятия.

Рудовмещающая красноцветная песчано-конгломератовая толща девона налегает со стратиграфическим несогласием на докембрийскую толщу, прорванную каледонскими гранитами. Рудный горизонт приурочен к низам верхнего девона, сложен грубозернистыми аркозовыми песчаниками с редкими прослоями конгломератов в верхней части. Максимальная мощность горизонта 66-75 м.

Красноцветная толща вмещает три согласно залегающих пласта марганцевых руд мощностью 5 м. В зонах тектонических разломов и в юго-восточной половине месторождения наблюдается увеличение мощности рудных залежей. Простираие пластов северо-западное, падение юго-западное. Размеры по простиранию 500 м (Восточная залежь) и 300 м (Западная залежь). Длина рудных тел 550 м. В рудных пластах имеются раздувы, пережимы и породные прослои. Выклинивание пластов постепенное.

Главные рудные минералы - браунит (60-80%), псиломелан (20-40%); второстепенные - пиролюзит, родохрозит, манганит, гематит; редкие - яковсит, фриделит, родонит; нерудные - кварц, биотит, реже каолинит, кальцит, барит.

Окислы марганца развиты в цементе конгломератов и песчаников, образуя конгломератовые, цементные, пятнистые и пористые текстуры.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Жездинское), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - населённый пункт и буферная зона населенного пункта - п.Жезды
-  - лицензии на ГИН
-  - железная дорога

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
марганцевые руды	A+B+C1- 589 тыс.т	11 тыс.т


Местоположение: расположено Жаксынском районе в 3 км севернее ж.-д. станции Жаксы.

Краткая геологическая характеристика: Приурочено к юго-западной части Калмаккульского синклинория. В красных глинисто-кремнистых сланцах нижнего ордовика многочисленны маломощные рудные прослойки. Количество рудных слоев в рудоносных пачках от 4 до 20, иногда до 80. Мощность отдельных слоев меняется от 5 см до 2,1 м. Суммарная мощность их достигает 10 м. Наиболее насыщены рудой участки частых фациальных взаимопереходов красных сланцев к фиолетово-серым. Мощность рудоносного горизонта 250-280 м. Месторождение состоит из 6 обособленных участков, вытянутых в северо-западном направлении на 8 км. На каждом участке рудный горизонт прослежен от 100-600 до 1500 м. Рудные тела состоят из чередующихся слоев браунитовых руд и глинистых пород, имеют пласто- и линзообразную форму, смяты в узкие складки. В зонах выклинивания рудных пластов нередко залегают конкреционные (валунчатые) руды.

Из нерудных минералов присутствуют кварц, кальцит, халцедон, хлорит, серицит. Изредка фиксируется примесь пирита и халькопирита.

Своеобразным типом руд являются в различной степени омарганцованные сланцы. Степень оруденения самая различная - от редкой вкрапленности до полного замещения породы рудными минералами. Содержание марганца в первичных рудах от 7,8 до 53,65% (в среднем 24,7%); железа 6,21 %, фосфора 0,05%. В рудах зоны окисления, %: Mn - 30; Fe - 4,05; SiO₂ - 34,75; глинозема - 4,45; извести - 2,05; магнезии - 1,13; серы - 0,006; фосфора - 0,062.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
марганцевые руды	C2-2131,9 тыс.т	-



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Жаксы), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - расторгнутая контрактная территория ТОО "ТКС-Жаксылык", участок Жаксылык. Контракт № 4131 от 31.07.2012 г. на разведку марганца, расторгнут в 2017г. (акт обследования/ликвидации в Обществе отсутствует)
-  - лицензии на ГИН
-  - буферная зона населенного пункта с. Жаксы

Месторождение Тогай-1


Карагандинская область

11

Местоположение: расположено расположен в 3 км к западу от Кентобе.

Краткая геологическая характеристика: рудное тело приурочено к контакту эффузивов со сланцами. Рудовмещающие породы - эпидотизированные скарноиды и скарны. Рудное тело линзообразной формы залегает согласно с вмещающими породами, протяженность 200 м, мощность 58-60 м на западном фланге и 16 м - на восточном. Падение на север под углом 67-75°, глубина залегания 0-93 м. Руды существенно гематитовые, с незначительным количеством магнетитовых (с гнездами мушкетовита и пирита) в центральной части тела. В приповерхностной части отмечается обогащение руд мартитом. Состав первичных руд - гематит, магнетит, пирит, пирротин, халькопирит, сфалерит; окис-лennых - гетит, лимонит, мартит. Содержание железа в первичных рудах от 42,16 до 53,37 %, серы 5,7 %, фосфора -0,02 %, в окисленных - от 44,47 до 59,53 % железа, 0,74 % серы и 0,022 % фосфора. Обогащенность первичных руд средняя, окисленные руды - без обогащения.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
железные руды	C2-733 тыс.т	-




— территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Тогай-1), для дальнейшего выставления на аукцион

— лицензии на ГИН

Местоположение: расположено в 600 м к югу от участка Тогай I.

Краткая геологическая характеристика: оруденение локализуется в небольшой синклинальной складке. Рудовмещающие породы - эпидотизированные скарноиды и скарны. Внутреннее строение рудного тела аналогично Кентобе. Здесь также магнетитовые руды заключены в «рубашку» скарноидов и скарнов мощностью не более 5 м и лишь в западной части тела, где руды выклиниваются, скарноиды с вкрапленностью и гнездами магнетита достигают мощности 18-20 м. Рудное тело субширотного простирания, линзообразной формы, длина - 160 м, средняя мощность 18 м.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
железные руды	A+B+C1- 639 тыс.т, C2-169 тыс.т	381,7 тыс.т



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Тогай-2), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН

Местоположение: расположено на территории Актогайского района Карагандинской области в 40-45 км к западу от г. Балхаш и в 16 км к северу от рудника Гульшад.


Краткая геологическая характеристика: Месторождение Биркси располагается в пределах двух крупных тектонических единиц Северо-Западного Прибалхашья, вблизи границы Тасарал-Кызылэспинского антиклинория и Токрауского синклинория. В области сочленения с Тасарал-Кызылэспинским антиклинорием Токрауский синклинорий сложен магматитами карбонового и пермского возраста. Все породы, слагающие месторождение, в той или иной степени подвержены метасоматическим изменениям (окварцеванию, серицитизации, алунитизации, каолинизации и пропилитизации). Особенно интенсивно изменены андезитовые порфириды и их туфы, они превращены в кварц-серицитовые метасоматиты и разбиты густой сетью кварцево-прожилкового штокверка. В минералогическом отношении полиметаллические руды, встреченные на участке Биркси, состоят, в основном, из пирита, галенита, сфалерита, реже отмечаются бурнонит и энаргит, в единичных случаях – халькозин и халькопирит.

Распределение свинца и цинка в рудных телах месторождения Биркси не равномерное. Значения коэффициента вариации, рассчитанные по содержаниям свинца и цинка в рудных телах, колеблются в пределах 50-118%. С учетом структурно-морфологических типов рудных тел и неравномерного распределения в них полезного компонента месторождение по сложности геологического строения отнесено к 3 группе.

В пределах месторождения выделено 51 линейно вытянутых круто-залегающих рудных тела и 5 рудных линз, из которых в 10 сосредоточено около 74% посчитанных запасов.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
свинец	C2 – 96,69 тыс.т	-
цинк	C2 – 42,62 тыс.т	-
серебро	C2 – 525,18 тонн	-




Местоположение: Месторождение Июльское расположено в Мугоджарском районе Актюбинской области, в 22 км к юго-западу от месторождения Бугетысайское, на правом берегу р. Тулепсай, правого притока р. Улы-Талдык. Открыто Т.Г.Павловой. Изучалось в 1967-1973 гг. О.И. Тимофеевым, В.Г. Куцем, Г.И. Бурдом, Т.М. Вольхиной и др.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к Карасайской антиклинали. Вмещающие породы - высокоглиноземистые двуслюдяные гнейсы с маломощными прослоями амфиболитов и слюдистых кварцитов - интенсивно мигматизированны. В них выявлены четыре тела асбестоносных метаультрамафитов, формирующих четкообразную цепочку длиной около 4 км. Промышленная асбестизация установлена лишь в теле 1, являющемся наиболее крупным. Длина его 180 м при мощности в центральной части 55 м. Простираение субмеридиональное

Ядро тела сложено серпентинитами, сменяющимися к периферии тальк-антофиллит-карбонатными породами с реликтами серпентинитов, затем тальк-антофиллитовыми; краевые части - тальк-вермикулит-актинолитовые и вермикулитовые породы. В измененных зонах отмечается хлоритизация. Продуктивными являются зоны тальк-антофиллитовых и тальк-антофиллит-карбонатных пород, развитых в приповерхностной части тела и в его висячем боку. Руды месторождения спутанно-волокнистые, метельчатые; волокно в приповерхностной части окрашено гидроокислами железа. Среднее содержание волокна класса +0,5 мм -5,3%, класса +1,6 - 0,4%.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
асбест	A+B+C1 – 6,5 тыс.т	1,3 тыс.т



- территория включенная в ПУТФН на добычу ТПИ (м-е Июльское), для дальнейшего выставления на аукцион
- лицензии на ГИН

Месторождение Жила 31

Абайская область


15

Местоположение: Участок Жила № 31 Бакырчикского рудного поля расположен в Жарминском районе в 51 км к востоку от ж.д. станции Шар.

Участок открыт при проведении геолого-поисковых исследований в 1953-1972 г.г. в пределах Кызыловской зоны смятия Алайгырского рудного поля.

Краткая геологическая характеристика: Участок приурочен к Алайгырскому рудному полю, являющемуся составной частью более крупного Бакырчикского рудного поля. Главную рудоконтролирующую роль играют юго-восточные тектонические разломы, сопрягающиеся с Кызыловской зоной смятия. В геологическом строении района принимают участие палеозойские отложения, представленные в основном терригенно-осадочными породами каменноугольной системы. С поверхности палеозойские образования преобразованы в коры выветривания. Окисленные золотосодержащие руды, представляющие собой гипергенно-измененные породы кварц-карбонатного состава с прожилково-вкрапленной золотосульфидной минерализацией. Окисленная рудная зона, нижняя граница которой находится на глубине 20-40 м, приурочена к алевролито-песчаниковой толще, перекрытой маломощным чехлом элювиально-делювиальных отложений кайнозоя. Граница зоны окисления определялась на основе визуального осмотра керн и шлама проб. Форма рудных тел линзовидная.

По сложности геологического строения участок Жила № 31 отнесен к 3 группе. Вещественный состав окисленных руд изучен по трем укрупненным технологическим пробам в лаборатории ДГП ВНИИЦВЕТМЕТ. Руды характеризуются кварц-серицитовым и кварц-хлорит-серицитовым составом с примесью каолинита и окисленных рудных минералов. Золото самородное, неравномерно распределено и находится в микроскопическом или субмикроскопическом состоянии, образуя включения в кварце и лимонит-гетит-скородитовой массе. По результатам тестирования малых технологических проб (31 проба) на степень выщелачиваемости золота цианидом натрия получены показатели извлечения по разным пробам от 40 % до 93 %. Технологические исследования по переработке окисленных руд проводились по методу химического обогащения, основанного на выщелачивании золота раствором цианистого натрия и осаждения его с помощью активированного угля. Максимально возможная степень извлечения золота в раствор для исследуемых технологических проб составила: с содержанием золота 0,3 г/т - 60 %; с содержанием 0,5 г/т - 67,2 %; с содержанием 0,8 г/т - 83,6 %.



Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	A+B+C1 – 161,2; C2 – 19,8 кг	15,0 кг

-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-с Жила 31), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН

Месторождение Ново-Березовское


Восточно-Казахстанская область

16

Местоположение: находится в Глубоковском районе в 48 км северо-западнее г. Усть-Каменогорска, в 8 км к северо-западу от ж.-д. ст. Предгорная.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к протяженному узкому тектоническому блоку Иртышской зоны смятия, пересекающей юго-западное крыло Алейского антиклинория. Площадь месторождения сложена порфирами с пропластками туфов, линзами терригенных пород и известняков иртышской свиты живет-франа и порфирами по кварцевым порфирам и туфами дацитового состава фамена. Породы смяты в узкие изоклинальные складки северо-западного простирания с крутым (75-85°) юго-западным падением крыльев. Девонские отложения прорваны линзовидными штоками кварцевых диоритов среднего-позднего карбона и многочисленными дайками. Среди последних выделяются две группы – ранняя и поздняя. Ранняя группа – микродиориты, диоритовые и кварцевые диоритовые порфириты. Они интенсивно рассланцованы. Поздняя группа даек включает диоритовые порфириты и дацитовые порфиры массивного облика. Залегание пород осложнено многочисленными разрывными нарушениями, среди которых выделяются протяженные зоны повышенного рассланцевания и пластического течения пород. На интервалах повторного дробления тектонических сланцев эти зоны включают основную массу оруденения.

Главная залежь месторождения приурочена к зоне повышенного рассланцевания в лежащем боку интрузии кварцевых диоритов. Зона прослежена более чем на два километра. Падение её крутое юго-западное под углом 75-85°, склонение на северозапад под углом 35-45°. Выявлено восемь рудных тел лентообразной формы. Состав руд: пирит, пирротин, сфалерит, халькопирит, галенит, марказит, магнетит, арсенопирит, блеклая руда, виттехинит, висмутин, галеновисмутит, кварц, серицит, хлориты, барит. Основные типы руд: пирит-халькопирит-сфалеритовый и пирротин-халькопиритсфалеритовый. Полиметаллические и барит-полиметаллические руды имеют подчиненное значение. Текстуры руд: массивная, прожилково-вкрапленная, пятнистая, полосчатая, линзовидно-полосчатая. Среднее содержание меди – 1,67%, цинка – 4,85%, свинца – 1,67%, золота – 0,3 г/т, серебра – 17,8 г/т.



— территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Ново-Березовское), для дальнейшего выставления на аукцион

— лицензии на ГИН

— буферная зона населенного пункта с.Верхнеберёзовский

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.


Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	A+B+C1 – 161,0 кг; C2 – 1482,0 кг	150 кг
серебро	A+B+C1 – 9,8 тонн; C2 – 56,6 тонн	12,3 тонн
медь	A+B+C1 – 10,1 тыс.т; C2 – 78,4 тыс.т	4,2 тыс.т
свинец	A+B+C1 – 1,1 тыс.т; C2 – 4,9 тыс.т	0,2 тыс.т
цинк	A+B+C1 – 29,3 тыс.т; C2 – 166,0 тыс.т	6,1 тыс.т

Местоположение: расположено в пределах Семипалатинского испытательного полигона, на границе Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, в 100 км к западу от г. Семипалатинска и в 26 км к северу от пос. Балапан.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение было открыто в 1965 г. (участок Кемпир), в результате проведения Горностаевской партией АГЭ опережающих геофизических работ. В период 1974-1977 г.г. в пределах Болдыкольского рудного поля силами Горностаевской и Кулунджунской партий были проведены поисковые работы, в результате которых выявлены участки Болдыколь и Мышьяковый. На участке Болдыколь поисковые работы были продолжены в 1990-1994 г.г. В 2003 году в соответствии с контрактными обязательствами ГРК «Алтын-Тобе» проведены поисково-оценочные работы. Результаты этих работ представлены на рассмотрение ГКЗ. На утверждение ГКЗ представлены запасы только основных рудных тел. Кроме того, на месторождении оценены прогнозные ресурсы первичных золото-сульфидных руд категории Р1 в количестве 407,0 тыс.т, 837,0 кг золота с содержанием 2,06 г/т.

Выполненные укрупненные технико-экономические расчеты свидетельствуют о возможности переработки окисленных руд месторождения Болдыколь методом кучного выщелачивания при достаточно высокой внутренней норме прибыли – 38,2 % и сроке окупаемости 1,5 года.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
ЗОЛОТО	C2 – 198,5 кг	-



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Болдыколь), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН
-  - СИЯП

Месторождение Загадка уч.(Бакырчикское рудное поле)

Абайская область

18

Местоположение: расположен в Жарминском районе, в 3 км к западу от месторождения и одноименного горнодобывающего предприятия Бакырчик, в 51 км к востоку от жд. станции Шар, в 160 км к юго-востоку от г. Семипалатинска и в 90 км к юго-западу от областного центра г. Усть-Каменогорска.

Краткая геологическая характеристика: История геологического изучения рудной зоны участка Загадка тесно связана с изучением Кызыловской зоны смятия и открытием месторождения Бакырчик. Разведка (поисковые и разведочные работы) участка проводились с 1962 по 1974 г.г., в 1996 на участке выполнены заверочные работы с целью проверки данных, полученных в процессе ранее проведенных геологоразведочных работ. По геолого-структурному положению, контролю оруденения, минеральному составу руд рудная зона участка Загадка является полным аналогом месторождения Бакырчика. На участке выделено 6 рудных тел лентовидной формы и 12 линз.


По степени сложности геологического строения участок Загадка отнесен к 3-й группе.

Определение объемной массы окисленных руд месторождения Загадка проводилось путем отбора целиков, с последующим парафинированием образцов. Было отобрано 4 образца. Объемный вес парафинированных образцов составил 2,42 т/м³.

Объемный вес окисленной руды для подсчета запасов, с учетом естественной влажности, определенной по 30 образцам и равной 1,5 %, принят равным 2,48 т/м³

Результаты технологических опытов показывают возможность переработки окисленных руд месторождения Загадка методом цианирования с высоким извлечением золота (90-92%), при этом в хвостах обогащения содержание золота составляет 0,35 г/т.

Инженерно-геологические условия приняты аналогичные обследованным добычным карьерам района (участки Чалобай, Бакырчик, Алайгыр) имеющим глубину до 25 м и время стояния 15 – 25 лет, и характеризуются как простые.



- территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Загадка уч. (Бакырчикское рудное поле), для дальнейшего выставления на аукцион
- лицензии на ГИН
- буферная зона населенного пункта
- буферная зона скотомогильника

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	C2 – 105,0 кг	-


Месторождение Березовское

Восточно-Казахстанская область

19

Местоположение: расположено в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, в 49 км северо-западнее г. Усть-Каменогорска, в 160 км к юго-востоку от ж.-д. ст. Защита. Координаты: долгота 82°12', широта 50°16'. Открыто: в 1730 г.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение находится в Березовско-Белоусовском рудном поле, представляющем собой блок рудноалтайской глыбы, вовлеченной в зону Иртышского глубинного разлома. Рудное поле сложено серицит-хлоритовыми, хлорит-кварцевыми, углисто-глинистыми и кремнистыми сланцами, доломитизированными известняками и риолитами шипулинской свиты живета. Выделено пять рудных залежей (Основная, Юго-Восточная, Юго-Западная, СевероЗападная и Параллельная), включающих большое количество рудных тел. Форма рудных тел неправильная, ленто- и линзовидная с кулисообразным расположением. Руды полиметаллические. Отношение меди, цинка и свинца 1,02:4,5:1. Выделено три типа руд: свинцово-цинковый, медно-цинковый, медно-пирротиновый. Среднее содержание свинца – 1,0%, цинка – 4,9%, меди – 1,8%, золота – 1,09 г/т, серебра – 76 г/т. Состав руд: пирит, сфалерит, халькопирит, галенит, пирротин, блеклая руда, мельниковит-пирит, арсенопирит, бурнонит, магнетит, кварц, доломит, анкерит, серицит, альбит, брейнерит. Элементы-примеси: золото, серебро, кадмий, индий, селен, теллур. Текстуры руд: массивная, полосчатая, вкрапленная. Околорудные изменения: окварцевание, хлоритизация, серицитизация, доломитизация. Зона окисления развита до глубины 40-50 м. В ней распространены монгеймит, малахит, азурит, лимонит, смитсонит, церуссит, ярозит, куприт, хризоколла, золото и др. Зона вторичного сульфидного обогащения прослежена до глубины 60-80 м. Она содержит халькозин, ковеллин, аргентит, марказит и др. Степень освоения: месторождение резервное.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Березовское), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН
-  - населенные пункты и буферные зоны с. Верхнеберёзовский
-  - буферная зона скотомогильника
-  - река

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
медь	A+B+C1 – 0,1 тыс.т, C2 – 1,8 тыс.т	0,1 тыс.т
серебро	-	0,6 тонн
свинец	A+B+C1 – 0,4 тыс.т, C2 – 0,1 тыс.т	0,1 тыс.т
цинк	A+B+C1 – 0,8 тыс.т, C2 – 4,9 тыс.т	0,2 тыс.т

Месторождение Батамшинское

Актюбинская область

20

Местоположение: расположено в 2 км южнее пгт. Батамшинск Актюбинской области. Открыто в 1933 г. при поисках месторождений силикатного никеля.


Краткая геологическая характеристика: Месторождение расположено в средней части Кемпирсайского массива гипербазитов в зоне восточного контакта его с вмещающими габбро-амфиболитами, на площади развития субширотных даек габбро-диабазов. Оруденение локализуется в коре выветривания серпентинитов, слагающих водораздельную возвышенность. Кора выветривания состоит из трех зон (снизу - вверх): выщелоченные нонтронитизированные серпентиниты, нонтронитовые глины, охры и охристо-нонтронитовые породы. Общая мощность элювия в среднем составляет 50 м. Промышленное кобальт-никелевое оруденение отмечено в пределах всех зон. На месторождении выделено две залежи, объединяющие 7 рудных тел, 6 из них к настоящему времени отработаны комбинатом «Южуралникель». Горизонтально залегающие рудные тела имеют пластообразную форму с волнистой кровлей и неровной подошвой, осложненной карманообразными понижениями. Протяженность рудных тел 225-1900 м, ширина 15 - 150 м, мощность 1-29,6 м, в среднем 4,8 м. Глубина залегания кровли рудных тел изменяется от 0,3 до 45 м. С поверхности они перекрыты чехлом неоген-четвертичных отложений. Соотношение литологических типов руд следующее: охры и обохренные нонтрониты - 10,9%, нонтронитовые глины - 38,8%, нонтронитизированные серпентиниты - 36,6%, выщелоченные серпентиниты - 13,7%.

Главные рудные минералы - нонтронит и гарниерит, второстепенные - керолит, никельсодержащий хлорит и асболан. Нонтронит присутствует во всех типах руд в количестве до 80% в виде комковатых воскоподобных с жирным блеском скоплений желто-зеленого цвета. Гарниерит встречается в форме плотных матовых корочек зеленого цвета и тонких ветвящихся прожилков.

Содержание основных полезных компонентов в рудах: никеля - 0,87%; кобальта - 0,037%. Вредные примеси: медь - 0,038%; оксид хрома - 3,5%. По содержанию основных шлакообразующих компонентов руды относятся к магнезиально-железистому типу.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	A+B+C1 – 2,2 тыс.т	0,6 тыс.т
кобальт	A+B+C1 – 104 тонн	27 тонн



Месторождение Шелектинское

Актюбинская область

21

Местоположение: в 3,5 км северо-восточнее ж.-д. станции Никель-Тау и в 16 км юго-западнее пгт. Батамшинский Актюбинской области. Выявлено в 1933 г. при изучении природных минеральных красителей месторождения.


Краткая геологическая характеристика: Кобальт-никелевое оруденение приурочено к коре выветривания аподунитовых серпентинитов, слагающих водораздельную поверхность. Кора выветривания представлена сокращенным профилем, в котором выделяются только две зоны: серпентинитов выщелоченных и нонтронитизированных и зона охр. Промышленное оруденение отмечено в обеих зонах. В пределах месторождения выделено 8 залежей кондиционных руд, объединяющих 16 рудных тел протяженностью от 25 до 750 м при средней мощности 3,3-6,8 м. Глубина залегания кровли рудных тел изменяется от 0,2 до 19 м. Все рудные тела месторождения имеют пластообразную форму и горизонтальное залегание с большой изменчивостью мощности. Форма тел в плане неправильная. Площади отдельных рудных тел достигают 213515 кв. м. Помимо промышленных, на месторождении выделено восемь некондиционных рудных тел небольших размеров с низкими содержаниями никеля и кобальта.

Главные рудные минералы нонтронит и никельсодержащий хлорит; второстепенные - керолит, гарниерит и асболан. Количество нонтронита не превышает 40-50% объема породы, хлорита 10-30%. Они встречаются в виде агрегативных скоплений чешуйчатых зерен зеленого цвета. Асболан образует тонкие прожилки в выщелоченных серпентинитах и плотные корочки в пустотах породы. Количество его в руде составляет около 1%.

Руды месторождения разделяются по химическому составу на два технологических типа: железистый, составляющий около 75% запасов и железисто-магнезиальный - 25% запасов. Среднее содержание никеля в руде - 1,27%, кобальта - 0,05%, меди - 0,048%, оксида хрома - 2,5%.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	A+B+C1 – 3,5 тыс.т	6,1 тыс.т
кобальт	A+B+C1 – 247 тонн	220 тонн



- территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Шелектинское), для дальнейшего выставления на аукцион
- лицензии на ГИН
- река


Местоположение: находится на территории Мугоджарского района Актюбинской области.

Краткая геологическая характеристика: Горизонты, линзы и прослои марганцевых руд и омарганцованных пород локализируются в пределах шулдакского горизонта на контакте его с отложениями млыашинской и улутауской свит, ассоциируя с кремнистыми и глинисто-песчанисто-гравийными образованиями. Промышленное оруденение контролируется северным фрагментом Берчогурской мульды в ее центриклинальном замыкании. Восточное крыло структуры, где расположены основные рудные залежи, характеризуется пологим залеганием пород и руд под углом 20-40° к горизонту по направлению к центру мульды. Фрагменты рудных тел и собственно рудные тела подчиняются структурно-тектоническому контролю, локализуясь вдоль восточного борта синклинали, и подпружены эффузивными образованиями среднего девона.

Марганцевое оруденение локализуясь в пределах шулдакского горизонта прослеживается в субмеридиональном направлении на расстояние до 2-2,3 км. В качестве основных рудных зон, характеризующих этот горизонт, фигурируют - Северо-Западная, Центральная и Юго-Восточная рудные зоны.

По вещественному составу руды месторождения Чуулдак относятся к пиролюзит-псиломелановому ряду силикатно-марганцевой формации. В большинстве случаев руда представлена пиролюзитом, который в различной степени замещается псиломеланом.

Содержание полезного компонента в пределах зон марганцевого оруденения варьирует от 0,2-0,3 до 49,4-52,7 %, а по выявленным рудным телам, колеблется от 10,1 до 52,7 % составляя в среднем по месторождению 20,41 %.



Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
марганцевые руды	A+B+C1 – 47,9 тыс.т, C2 – 49,8 тыс.т	37,9 тыс.т


Месторождение Чанды-Булак

Восточно-Казахстанская область

23

Местоположение: расположено в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, в 30 км на юго-восток от поселка Большенарымское и в 20 км на северо-запад от поселка Маралиха. Открыто в 1895 г. Разрабатывалось с 1895 по 1920 гг.

Краткая геологическая характеристика: Россыпь долинного типа, четвертичного возраста. Протяженность ручья Чанды-Булак 500 м. Долина имеет трапецевидную форму, со склонами крутизной 30-50. Днище (пойма) имеет ширину от 100 до 260 м, ширина русла 3-8 м, глубина до 0,4 м. Мощность пойменных отложений 1,5-5,6 м. Коренными источниками золота являются золотоносные кварцевые жилы, зоны сближенных кварцевых жил и окварцованные листвениты, Торфа представлены валунно-галечным материалом с песчано-суглинистым заполнителем, коэффициент валунности 10%. Мощность торфов 1,2-6,7 м. Плотик сложен метаморфизованными песчаниками, алевролитами и лиственитами среднего девона. Пески представлены песчано-валунно-галечным аллювием. Гранулометрический состав песков близок к составу торфов, но отсутствует фракция суглинков. Россыпь локализуется в приплотиковой части золотоносных отложений и на плотике. Форма ее лентообразная, прерывистая, длина 160-210 м, мощность 0,2 до 1,2 м. Распределение золота в россыпи неравномерное. Золото преимущественно мелкое 0,5-1,0 мм, пластинчатое, средней окатанности, пробность 900. Минералами-спутниками золота являются рутил, касситерит, шеелит, пирит. Содержание золота в песках неравномерное и колеблется от 0,354 до 8,26 мг/м³. Отмечаются отдельные участки песков с гнездовым распределением содержаний золота. Среднее содержание золота 1,517 г/м³. Степень освоения: Месторождение резервное.



- территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Чанды-Булак), для дальнейшего выставления на аукцион
- лицензии на ГТИН
- лицензии на ГИН
- лицензии на старательство
- водоохранная зона
- река

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
ЗОЛОТО	A+B+C1 – 43,3 кг	-

Месторождение Большая Буконь


Восточно-Казахстанская область

24

Местоположение: расположено в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в 42,5 км к северо-западу от поселка Жумба и в 40 км к северо-востоку от поселка Кокпекты.

В 1942 и 1948 гг. в небольшом объеме геологоразведочные работы проведены силами ГРБ Джамбульского рудника. В 1953 году разведка осуществлена ЮжноКалачинской ГРП. Золотоносность связана с отложениями первой террасы р. Б. Буконь.

Краткая геологическая характеристика: Геологический профиль представлен: торфами, сложенными почвеннорастительным слоем (0,5-0,8 м), серыми суглинками, содержащими небольшие количества гравия и песка (1-5 м). Мощность торфов – 3,0 м, пески представлены песчано-гравийногалечными отложениями с галькой до 6-15 см и валунами до 30 см в диаметре. Плотик сложен песчаниками, переслаивающимися с алевритами. Россыпь прослежена на 4,2 км и в целом не оконтурена. Ширина её достигает 100-250 м. Мощность золотоносного пласта 0,5-3 м.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Большая Буконь), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН
-  - река

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
ЗОЛОТО	A+B+C1 – 57,0 кг, C2 – 36,0 кг	-

Месторождение Миялы

Абайская область

25


Местоположение: находится на территории Жарминского района в 90 км к западу от города Усть-Каменогорск.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение обнаружено в 1949 году при поисках золота в бассейне рек Мулды-Булак и Караозек; в 1949-1965 годы на его территории проведены поисковые и поисково-разведочные работы; в 1985-1988 годы выполнена предварительная разведка. Месторождение расположено в центральной части Зайсанской складчатой системы в зоне Миялинского разлома. В геологическом строении месторождения принимают участие терригенные отложения башкирского яруса нижнего-среднего карбона. Золотоносная часть месторождения сложена песчаниками, алевролитами с прослоями пепловых туфов и линзами порфириров и известняков башкирского яруса.

Рудные тела месторождения не имеют четко выраженных границ и выделяются по данным опробования. По сложности геологического строения месторождение Миялы отнесено к 3 группе.

Горно-геологические условия и горнотехнические особенности месторождения охарактеризованы с достаточной полнотой и оцениваются как простые. В пределах месторождения выделен один технологический тип руд -окисленные золотосодержащие руды в каолинит-гидрослюдистых корках выветривания.

По минеральному составу окисленные руды характеризуются следующими показателями: кварц - 45%, нонтронит-каолинит 26%, серицит +полевой шпат - 8%, гидрослюды - 10%, гидроокислы железа – 1-2%, ярозит - 1% и др.



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Миялы), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - отозванный контракт ТОО «НПП Марганец», отвалы. Контракт №5283 от 20.04.2018 г. на добычу золота расторгнут в 2022 г. (акт обследования/ликвидации в Обществе отсутствует)
-  - лицензии на ГИН
-  - центры ТМО
-  - скважины ПВ

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
ЗОЛОТО	C2 – 380,5 кг	-

Месторождение Харьковское (участки 1, 2, 3, 4)

Костанайская область

26

Местоположение: в Аулиекольском районе Костанайской области, в 20 км к юго-западу от ж.д. ст. Кушмурун. Северо-восточная часть его примыкает к месторождению Кушмурун.


Краткая геологическая характеристика: Месторождение детально разведано в 1947-50 гг. (А.П. Тюрин, М.В. Бунина, Г.Т. Юхно).

Угленосные отложения кушмурунской свиты образуют пологую брахисинклинальную структуру северо-восточного простирания и содержат 16 пластов угля, залегающих на глубине от 70 до 180 м. Максимальная мощность их (суммарно) 33 м. Наибольшую мощность имеют пласты Мощный, 4, 5 и 12. Угли бурые (Б2), с зольностью до 22%, малосернистые (0,8%), с теплотой сгорания горючей массы 0,7 тыс. ккал/кг.

Небольшая мощность пластов угля при значительной глубине их залегания делает невозможной открытую отработку месторождения

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
уголь	A+B+C1 – 16782 тыс.т, C2 – 324 тыс.т	4482 тыс.т



— территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Харьковское уч. 1, 2, 3, 4), для дальнейшего выставления на аукцион

— лицензии на ГИН

Месторождение Акшоки III (Западная и Восточная жилы)

Улытауская область

27


Местоположение: в Улутауском район в 45 км к север-северо-востоку от пос. Актас и в 45 км от ж.д. станции Жезды; выявлено Н.Н.Вороновым в 1939 г.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение Акшоки-3 сложено эффузивными и осадочными породами ранне-среднедевонского возраста, представленными андезитовыми порфиритами, отдельными пластами мелкозернистых полимиктовых песчаников со значительной примесью туфового материала. Кварцевые жилы образуют широтную зону общей протяженностью до 2 км и в рельефе выражены цепью холмов с относительным превышением до 30 м. Зона образована двумя крупными кварцевыми жилами (Восточная и Западная) и рядом мелких кварцевых тел и прожилков, имеющих различное простирание, длину, мощность и отличающихся строением жильного кварца. Форма жильных тел неправильно-плитообразная и линзовидная, осложненная раздувами и пережимами как по падению, так и по простиранию. Максимальная глубина залегания кварцевых жил на прослеженных интервалах - 75 м.

Жилы сложены средне- и крупнозернистым массивным кварцем молочно-белого и серовато-белого цвета. В отдельных местах отмечается друзовый, полупрозрачный крупнокристаллический и шестоватый кварц, а также друзовые щетки и отдельные кристаллы горного хрусталя. Кристаллы призматического габитуса, в основном мутные, размером до 6-8 см по длинной оси.

Западная жила располагается в 0,5 км к западу от Восточной жилы и в рельефе образует холм с относительным превышением до 40 м, вытянутый в широтном направлении. Жильная зона представлена здесь тремя мощными (3-6 м) и рядом более мелких тел плитообразных и линзовидных форм. Общая протяженность зоны до 160 м. Суммарная мощность до 15 м. Длина тел от 120 до 140 м.

Восточная жила - неправильно-плитообразное тело, осложненное раздувами и пережимами, протягивается в широтном направлении на 1 км. По падению жила прослежена до глубины 200-260 м. Мощность жилы в среднем 8-10 м (это около 2 млн. м³ или 5 млн. тонн кварцевого сырья).



-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Акшоки III, западная и восточная жилы), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
Молочно-белый кварц	C1 – 1796 тыс.т (Запасы указаны всего по месторождению Акшоки-III)	-

Местоположение: Месторождение Щербаковское выявлено в 1955 г. при проверке бурением магнитометрических аномалий. Расположено в 3 км восточнее ж.-д. станции Никель-Тау и в 20 км южнее пгт. Батамшинский Актюбинской области.


Краткая геологическая характеристика: Промышленное оруденение локализовано в коре выветривания, развитой на контакте апоперидотитовых серпентинитов и габбро-амфиболитов и сохранившейся в виде отдельных пятен на пологих склонах водораздельной поверхности. Кора выветривания представлена сокращенным профилем, в котором выделяются две зоны: нонтронитизированных серпентинитов и охристых продуктов выветривания. Мощность элювия не превышает 30 м. Месторождение представлено тремя рудными телами отстоящими друг от друга на 30-100 м. Форма рудных тел в плане неправильная с извилистыми очертаниями. В разрезе рудные тела имеют пластообразную форму, горизонтальное залегание и большую изменчивость мощности, обусловленную сложной конфигурацией подошвы рудных тел с карманообразными углублениями. Протяженность рудных тел по простиранию варьирует в пределах 70-1760 м при средней ширине 85 м, мощности от 1 до 26 м, в среднем 6,9 м. Общая площадь рудных тел 472955 кв. м, глубина залегания кровли от 0,2 до 28 м. По бортовому содержанию никеля 0,5% оконтурено четыре рудных тела с забалансовыми запасами площадью от 14 до 525 тыс. кв. м.

Главные рудные минералы - нонтронит, никельсодержащий хлорит, второстепенные - керолит, гарниерит и асболан. Нотронит составляет около 40% породы в виде агрегативных скоплений чешуйчатых зерен зеленого и бурого цвета. Хлорит образует плотные массивные агрегаты и отдельные мелкие чешуйки. Количество асболана в руде около 1%. Он встречается в форме натечных корочек и тонких прожилков.

На месторождении выделено три технологических типа руд: железистые, слагающие 85% запасов, магнезиальные - 13% и кремнистые - 2%. Содержание никеля в балансовых рудах в среднем 1,1%, кобальта - 0,04%, меди - 0,03%, оксида хрома - 2,5%. Технологические испытания показали неудовлетворительную спекаемость руд и необходимость подшихтовки их к рудам других месторождений.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	A+B+C1 – 1,4 тыс.т,	17,1 тыс.т
кобальт	A+B+C1 – 80 тонн	829 тыс.т




Местоположение: Шламонакопитель №1 цеха дробления и предварительного обогащения в тяжелых средах (далее ЦДО) обогатительной фабрики Риддерского горно-обогатительного комбината (РГОКа) административно расположен на территории, подчиненной маслихату г. Риддер Восточно-Казахстанской области. Шламонакопитель находится в 16 км от г. Риддер на промышленной площадке Тишинского рудника РГОКа ТОО «Казцинк» и в 104 км от областного центра – г. Усть-Каменогорск.

Краткая геологическая характеристика: Заполнение Шламонакопителя №1 шламами отмывки сульфидных полиметаллических руд Тишинского месторождения при их переработке в цехе дробления и частичного обогащения в тяжелых средах осуществлялось в период 1982-2002 годов. Накопленные шламы, содержащие значительные количества цветных металлов, под воздействием природных факторов подверглись окислительным процессам. Атмосферные осадки, просачиваясь сквозь техногенные минеральные образования (ТМО), растворяют и выносят цветные металлы в подземные воды и в поверхностный сток реки Ульба.

Геологоразведочные работы на Шламонакопителе №1 проводились в 2003 и 2011 годах путем бурения скважин с поверхности лежалых шламов.

Минералогический состав шламов блеклорудно-галенит-халькопирит-сфалерит-пиритовый и в целом аналогичен исходной руде Тишинского месторождения. Из нерудных минералов преобладают кварц, карбонат, серицит, хлорит. Из редких минералов обнаружено золото крупностью 0,003×0,015 мм. Техногенная примесь в шламах – ферросилиций, магнетит, граншлак, цемент, древесный уголь. Цемент существенно осложняет флотацию шламов, образуя при доизмельчении цементные шламы, действующие как депрессоры и снижающие флотацию галенита.

В то же время шламы имеют повышенное количество окисленных форм минералов, не характерное для первичных руд и связанное с длительным нахождением лежалых шламов в отвалах. В целом лежалые шламы характеризуются как труднообогатимое сырье.



Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
Золото	A+B+C1 – 536,0 кг	-
медь	A+B+C1 – 2,8 тыс.т	-
серебро	A+B+C1 – 7,2 тонн	-

- контур месторождения ТМО Шламонакопителя №1, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
- лицензия на ГИН
- населённый пункт с. Ульба

Местоположение: Шламонакопитель №2 цеха дробления и предварительного обогащения в тяжелых средах (далее ЦДО) обогатительной фабрики Риддерского горно-обогатительного комбината (РГОКа) административно расположен на территории, подчиненной маслихату г. Риддер Восточно-Казахстанской области. Шламонакопитель находится в 16 км от г. Риддер на промышленной площадке Тишинского рудника РГОКа ТОО «Казцинк» и в 104 км от областного центра – г. Усть-Каменогорск.


Краткая геологическая характеристика: Заполнение Шламонакопителя №2 шламами отмывки сульфидных полиметаллических руд Тишинского месторождения при их переработке в цехе дробления и частичного обогащения в тяжелых средах осуществлялось в период 1982-2002 годов. Накопленные шламы, содержащие значительные количества цветных металлов, под воздействием природных факторов подверглись окислительным процессам. Атмосферные осадки, просачиваясь сквозь техногенные минеральные образования (ТМО), растворяют и выносят цветные металлы в подземные воды и в поверхностный сток реки Ульба.

Геолого-экономическая оценка подсчитанных запасов не проводилась и рентабельность освоения шламов не оценивалась в виду того, что рекультивация шламонакопителя предполагается независимо от экономического эффекта, вследствие экологической необходимости. Утилизация шламов шламонакопителя №2 существенно снизит негативное влияние на подземные воды и поверхностный сток р. Ульбы.

Запасы подсчитаны в естественных границах ТМО, кондиции для подсчета запасов шлама не разрабатывались. Подсчитанные по состоянию на 01.11.2008 г. запасы шламонакопителя №2 разделены на накопленные до 01.09.2011 запасы шламонакопителя отдельно накопленные до 01.06.1992 года принадлежащие государству, и образованные после указанной даты и являющиеся собственность ТОО «Казцинк».

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
Золото	A+B+C1 – 181,5 кг	-
медь	A+B+C1 – 1,2 тыс.т	-
серебро	A+B+C1 – 12,2 тонн	-



- контур месторождения ТМО Шламонакопителя №2, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
- лицензия на ГИН
- населённый пункт с. Ульба

Месторождение Челак-Карасу

Карагандинская область


31

Местоположение: Баритовое месторождение Челак-Карасу расположено в Осакаровском районе Карагандинской области в 43 км севернее рабочего поселка Молодежный и в 5,5 км северо-западнее поселка Родниковский. От г. Караганды участок удален на 150 км к северо-востоку.

Краткая геологическая характеристика: В 1957–1959 гг. месторождение оценивалось Майкаинской геологоразведочной экспедицией на предмет выявления золото-серебряного оруденения путем проходки канав, мелких шурфов и единичных скважин. По результатам этих работ выявлено и прослежено две баритовые жилы, из которых наиболее выдержанной является жила №1. На основании разведочных работ был сделан вывод, что баритовые рудные тела выклиниваются на глубине 30–40 м, а содержания золота и серебра в них не достигают промышленных значений.

Качество баритовых руд, разведанных на месторождении Челак-Карасу, изучено по 14 рядовым пробам. Учитывая высокое содержание барита в руде и незначительное – вредных примесей, принято решение провести оценку качества баритовых руд по требованиям к качеству концентрата баритового (ГОСТ 4682–84), т.е. баритовые руды жилы №1 рассматривать как природный баритовый концентрат.

По содержанию барита в руде в отдельных рудных пересечениях, в подсчетных блоках и в целом по жиле №1, руда соответствует марке КБ–2 (не менее 92%). По содержанию вредных примесей – окиси железа, водорастворимых солей, двуокиси кремния и реакции водной вытяжки – руда соответствует марке КБ–1 класса А. По содержанию суммы кальция и магния в пересчете на окись кальция руда соответствует марке КБ–2 класс А. По совокупности соответствия требованиям к качеству баритовые руды жилы №1 относятся к природным баритовым концентратам марки КБ–2 класс А.



- - контур месторождения Челак-Карасу, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
- ▤ - лицензия на ГИН


Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
барит	С2 – 8,0 тыс.т	-

Местоположение: месторождение находится 60 км к северо-западу от г. Кокшетау в Северо-Казахстанской области. Ближайшая ж.-д. станция Азат находится в 45 км к востоку от месторождения.

Краткая геологическая характеристика: Чеганские отложения, заключающие продуктивные пески, залегают на неровной поверхности размытой коры выветривания. Рудовмещающие пески представлены хорошо сортированными мелко- и тонкозернистыми разностями. В пределах разведанной площади выделены две рудоносные залежи песков - Верхняя и Нижняя, а также ряд отдельных линз. Полезными минералами являются ильменит, рутил и циркон. Кварц составляет 85% от всей массы песков. Месторождение характеризуется повышенным содержанием циркона. Месторождение изучено скважинами по сети 800x400 и 400x200 м, на юго-востоке 1600x400 м. Верхняя рудоносная залежь прослежена по простиранию в северо-западном направлении на 5,8 км при ширине от 0,8 до 1,5 км. Мощность колеблется от 0,5 до 2,5 м, глубина залегания - от 2,5 до 9,0 м. Нижняя залежь расположена в южной части площади, прослежена на 2,2 км при ширине от 0,4 до 0,7 км. Отдельные линзы вскрыты скважинами, имеют размеры, не превышающие 0,2x0,4 км). Пески чеганской свиты обводнены, воды безнапорные, залегают на глубине от 9 до 15 м. Дебиты по скважинам от 0,1 до 1,6 л/сек, при понижениях 1,6-6,3 м. Водоприитоки в карьер оценивались в 21,4 м³/час.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
титан	C2 – 138,0 тыс.т	-
цирконий	C2 – 117 тыс.т	-



□ - контур месторождения Летовочная россыпь, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион

▤ - лицензия на ГИН



Месторождение Восточно-Шандашинское

Актюбинская область

33

Местоположение: расположено в 5 км южнее ж.-д. станции Никель-Тау Актюбинской области. Месторождение Восточно-Шандашинское выявлено в 1957 г. в процессе специализированных поисков месторождений силикатного никеля.


Краткая геологическая характеристика: Никель-кобальтовое промышленное оруденение приурочено к коре выветривания аподунитовых и апоперидотитовых серпентинитов на контакте их с телом габброидов в пределах Юго-Западного антиклинального поднятия Кемпирсайского гипербазитового массива. Древняя рудоносная кора выветривания сохранилась от размыва на склонах пологой водораздельной возвышенности. В разрезе элювия выделяются три минеральные зоны (снизу - вверх): выщелоченных слабо нонtronитизированных серпентинитов, нонtronитовых глин, охристых продуктов выветривания. Породы всех трех зон содержат промышленные концентрации никеля и кобальта. Месторождение представляет собой одну горизонтально залегающую рудную залежь северо-восточного простирания длиной 520 м, шириной 130 м и мощностью от 1 до 21,6 м, в среднем составляющей 6,1 м. Глубина залегания рудного тела изменяется от 0,8 до 35 м. На периферии залежи выявлено три небольших по размерам тела некондиционных руд, отличающихся низкими содержаниями полезных компонентов.

Основной рудный минерал - нонtronит содержится в руде в количестве 40-90% объема породы в виде однородных глинистых масс и гнездовидных мелкочешуйчатых скоплений зеленого цвета. Асболан присутствует в форме прожилков и плотных натечных корочек черного цвета. Количество его не превышает 1-1,5%. В незначительном количестве присутствуют керолит, никельсодержащий хлорит и гарниерит.

По химическому и минеральному составам руды месторождения разделяются на три технологических типа: железистый - 68% (охры, нонtronиты), магнезиальный - 24,7% (выщелоченные и слабо нонtronитизированные серпентиниты) и кремнистый - 7,3% (кремнисто-охристые образования и опализированные серпентиниты). Среднее содержание никеля - 1,41%, кобальта - 0,05%, меди - 0,019%, оксида хрома - 1,85%.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	A+B+C1 – 1,0 тыс.т	3,2 тыс.т
кобальт	A+B+C1 – 27,0 тонн	241,0 тонн



□ - контур месторождения Восточно-Шандашинское, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион

▤ - лицензия на ГИН

Месторождение Ново-Шандашинское

Актюбинская область


34

Местоположение: Месторождение Ново-Шандашинское выявлено в 1937 г. при производстве поисков месторождений силикатных кобальт-никелевых руд в пределах Кемпирсайского массива гипербазитов. Находится в 5 км южнее ж.-д. станции Никель-Тау Актюбинской области.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к останцам древней коры выветривания серпентинитов в пределах Юго-Восточного поднятия Кемпирсайского массива, которые геоморфологически приурочены к плоской водораздельной возвышенности. Состоит из пяти залежей, объединяющих 26 рудных тел протяженностью по простиранию от 10 до 1500 м при ширине 10-1000 м. Мощность рудных тел от 1 до 19,4 м, глубина залегания кровли 0,1-29 м. Рудные тела в плане имеют извилистые очертания с пережимами и раздувами. В разрезе они представлены субгоризонтальными пластообразными залежами с изменчивой мощностью и сложными контурами. Помимо промышленных залежей на месторождении выявлено 76 тел некондиционных руд, не представляющих практического интереса.

Главные рудные минералы - нонтронит и керолит, количество которых в руде составляет около 90%, присутствуют в виде гнездовидных мелкочешуйчатых скоплений или сплошных землистых масс. В небольшом количестве встречается асболан. Среднее содержание в рудах никеля - 1,14%, кобальта - 0,053%, меди - 0,006%, оксида хрома - 1,22%.

Технологические свойства руд не изучались.



-  - контур месторождения Ново-Шандашинское, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
-  - лицензия на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	A+B+C1 – 218,5 тыс.т	99,0 тыс.т
кобальт	A+B+C1 – 27,0 тонн	241,0 тонн


Местоположение: Месторождение Кзыл-Каинское выявлено в 1935 г. при производстве геолого-съемочных работ масштаба 1:100000. Расположено в 8 км юго-восточнее ж.-д. станции Никель-Тау Актюбинской области.

Краткая геологическая характеристика: Промышленные концентрации кобальта и никеля связаны с корой выветривания серпентинитов, слагающих Кара-Агашскую синклиналь в пределах пологой водораздельной возвышенности. На месторождении выделено четыре рудных залежи пластообразной формы и горизонтального залегания с большой изменчивостью мощности и сложной конфигурацией кровли и подошвы. Протяженность рудных тел по простиранию 100-900 м при средней ширине 76 м, мощность от 0,8 до 22,3 м, в среднем по месторождению составляет 5,4 м. Глубина залегания кровли рудных тел варьирует в пределах 0,2-15,7 м. Общая площадь рудных тел на поверхности 396,9 тыс. кв. м. Кроме того, выделено четыре рудных тела с забалансовыми запасами некондиционных руд с бортовым содержанием никеля 0,5%. Характер залегания их аналогичен основным промышленным залежам.

Нонтронит присутствует в руде в количестве 40-90%. Образует мелкочешуйчатые агрегаты и сплошные землистые массы. Никельсодержащий хлорит (1-40%) встречается в виде плотных массивных образований. Количество керолита непостоянно и изменяется в пределах 1-10%. Встречается в виде прожилков белого и зеленого цвета. Прожилки, натеки и плотные корочки асболана не превышают 1-1,5%.

Руды месторождения подразделяются на два технологических типа: железистый и магнезиальный. Первый представлен охристо-нонтронитовыми рудами, второй - выщелоченными и нонтронитизированными серпентинитами. Наиболее эффективна переработка руды методом электроплавки на ферроникель. При этом извлечение никеля составляет 90% , кобальта - 75-80%. Усредненная руда содержит (%): никеля - 1,13, кобальта - 0,057, меди - 0,019%, оксида хрома - 4,79%.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	C2 – 1,5 тыс.т	6,4 тыс.т
кобальт	C2 – 37 тонн	656 тонн



□ - контур месторождения Кзыл-Каинское, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион

▤ - лицензия на ГИН

Месторождение Кокпектинское

Актюбинская область

36

Местоположение: расположено в 12 км западнее г. Хромтау и в 8 км юго-восточнее ж.-д. станции Никель-Тау Актюбинской области.


Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к коре выветривания серпентинитов на контакте их с телом габброидов, слагающих Тыгашасайскую антиклиналь. Останцы коры выветривания сохранились на склонах пологой водораздельной возвышенности. В разрезе рудоносного элювия выделяются три минеральные зоны (снизу-вверх): дезинтегрированные и выщелоченные слабо нонтронитизированные серпентиниты, нонтронитовые глины, охристые продукты выветривания и обохренные нонтрониты. Все литологические разновидности элювия являются промышленными рудами силикатного никеля. Месторождение состоит из четырех рудных тел протяженностью по простиранию от 70 до 1310 м и шириной 20-490 м при мощности от 1 до 28,3 м, в среднем составляющей 4,4 м. Глубина залегания кровли рудных тел варьирует в пределах 0,8-19,4 м. Рудные тела находятся на удалении 40-60 м друг от друга. Форма их изометричная и неправильная в плане с извилистыми очертаниями, вытянутая в субмеридиональном направлении согласно простиранию контакта серпентинитов с габброидами. В разрезе рудные тела представляют собой пластообразные залежи горизонтально залегающие с изменчивой мощностью, обусловленной карманообразными понижениями подошвы их. На периферии рудного тела № 1 выделено семь тел некондиционных кобальт-никелевых руд размером от 20х40 до 40х80 м при мощности 1,7-8,8 м. В связи с низкими содержаниями полезных компонентов эти руды отнесены к забалансовым.

Основной рудный минерал-нонтронит слагает около 90% породы и встречается в виде однородной глинистой массы бурозеленого цвета или воскоподобных скоплений в форме гнезд. Второстепенные минералы-керолит, никельсодержащий хлорит, асболан и кобальтосодержащий псиломелан составляют 2-3% объема породы. Они встречаются в форме гнезд, прожилков и натечных корочек в пустотах выщелачивания серпентинитов.

По химическому составу руды месторождения разделяются на два технологических типа: железисто-магнезиальный, слагающий около 65% запасов кобальт-никелевых руд и железистый - 35%. К первому типу относятся охристые продукты выветривания и нонтрониты, ко второму - слабо нонтронитизированные и выщелоченные серпентиниты. Руды отличаются повышенным содержанием кремнезема, в среднем составляющим 48,3% и низким содержанием железа - 23,5%, что вызывает необходимость шихтовки их легкоплавкими железистыми рудами других месторождений и известняком. При этом извлечение никеля в товарную продукцию составляет 70,9%, кобальта - 28,5%. Среднее содержание никеля в руде 1,22%, кобальта - 0,061%, меди - 0,005%, оксида хрома - 1,19%.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
никель	A+B+C1 – 3,3 тыс.т	0,1 тыс.т
кобальт	A+B+C1 – 181 тонн	29,0 тонн



-  - контур месторождения Кокпектинское, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
-  - лицензия на ГИН

Местоположение: расположено Ерментауском районе Акмолинской области, 4 км юго-западнее пос. Богембай, 18 км восточнее ж.-д. станции Аксу.

Краткая геологическая характеристика: в геологическом строении месторождения принимают участие теригенноосадочные отложения нижне-карбонового возраста (сероцветные песчаники, алевролиты, аргиллиты, пласты углей), слагающие относительно небольшую, синклиналию структуру (4х11км), расчлененную тектоническим нарушением на две муьды (Северную и Южную). По положению в разрезе, литологическому составу, фауне, характеру угленосности эти отложения по аналогии с Карагандинским бассейном, подразделяются на три свиты.


Промышленная угленосность связана с карагандинской свитой, в основании разреза которой установлен один сложный угольный пласт, мощностью 1-5м.

Пласт состоит из двух прослоев, из которых практическое значение имеет нижний, мощностью 2,5м. Мощность верхнего слоя иногда увеличивается от 0,6м до 2м, но обычно он выклинивается или замещается углистыми аргиллитами. Максимальная глубина залегания угольного пласта 400м.

Угли месторождения каменные, гумусовые, высокозольные и очень труднообогатимые. Зольность угольной массы – 35-45%, содержание серы – 1,0-1,5%, фосфора – 0,01-0,02%, теплота сгорания на горючую массу 8000-8500 ккал/кг, низшая рабочего топлива – 4500-5500 ккал/кг, выход летучих – 20-22%. Угли слабо спекаются, толщина пластического слоя 8-12мм. Они относятся к марке ОС и пригодны только в качестве энергетического топлива.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
уголь	A+B+C1 – 5134 тыс.т	14700 тыс.т



□ - контур месторождения Богембай, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион

▨ - лицензия на ГИН

○ - населённый пункт и буферная зона с. Богембай


Местоположение: в западной части Центрального Казахстана в Жездинском районе Карагандинской области, в 40 км на юго-запад от рудника Жезказган 5 км от месторождения Кумола.

Краткая геологическая характеристика: месторождение было выявлено и изучалось Н. Н. Ведерниковым, О. Б. Бейсеевым в 1956-1962 гг. В 1981-1983 гг. на месторождении были продолжены работы целью доразведки и подготовки его к промышленному освоению.

Месторождение приурочено к Кумолинской синклинали, сложенной верхнепалеозойскими отложениями, разрез которых венчается породами пермского возраста. Месторождение относится к типичным стратиформным. Оруденение имеет четко выражая пластовый характер. Выделяется два рудных тела (верхнее и нижнее), расположенные в верхней трети разреза отложений благоприятных фаций ушбулакской свиты. Рудные состоят из неразрывно связанных двух и трех горизонтов. Углы падения рудного тела довольно| не выдержаны и варьируют от 3-5 до 90 градусов.

Результаты испытаний волокна родусит-асбеста показали, что в опытной партии фильтровального картона ФМБ-РЛ оно имеет неустойчивое качество и не удовлетворяет ужесточенным требованиям ГОСТа В-20988-83. Проблема использования волокна осложняется также тенденцией замены в специзделиях голубых асбестов стекловолокном ломким хризотил-асбестом.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
асбест	A+B+C1 – 6,7 тыс.т, C2 – 2,2 тыс.т	2,7 тыс.т



Месторождение 94


Западно-Казахстанская область

39

Местоположение: расположено в 15 км к юго-востоку от пос. Индерборский.

Краткая геологическая характеристика: Площадь месторождения сложена соляной толщей, элювиальными образованиями гипсовой шляпы и неоген – четвертичными отложениями. По условиям образования на месторождении можно выделить два яруса пород: коренные соляные отложения и породы гипсовой шляпы. Морская терригенная формация, хвалынский горизонт; элювиальные образования гипсовой шляпы позднепермско - четвертичного возраста по борно- калийному горизонту шушактауской пачки кургантауской свиты ранней перми. Средняя мощность кровли 40 м.

Основная часть запасов располагается ниже уровня водоносного горизонта. Месторождение разрабатывается открытым способом. Обводненное рудное тело по опыту Индерского рудника будет отрабатываться без осушения карьера. Вскрышные и вмещающие рудное тело породы представлены белыми и серыми гипсами, ангидритом и глинами, а также песчано-глинистыми отложениями, привнесенными по древнему и современному карсту.



-  - контур Месторождение 94, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
-  - лицензия на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
борные руды	C1 – 11,6 тыс.т	-

Месторождение Майбулак Восточный

Жамбылская область

40

Местоположение: Месторождение Майбулак Восточный расположен в Жамбылской области в 40 км от ж-д ст. Отар.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение открыто в 1966 году. Основная масса золотоносных зон и золоторудных жил залегает внутри интрузии диоритов Майбулакского комплекса, редко на контакте их с метаморфизованными песчаниками щербактинской свиты.

Генезис оруднения -гидротермальный плутоногенный в условия средних температур, малосульфидная рудная формация, золото-пирит-кварцевый минеральный тип.

Околорудные изменения вмещающих пород представлены интенсивными серицитизацией, пиритизацией - 10-20 м; гематизация слабая -5-10 м.


Основная масса золотоносных зон и золоторудных жил залегает внутри интрузии диоритов Майбулакского комплекса, редко на контакте их с метаморфизованными песчаниками щербактинской свиты. Приповерхностные изменения тел развиты слабо и представлены налетами и пленками по трещинам гидроокислов железа и меди за счет окисления сульфидов.

Непромышленные рудные тела представлены маломощными и прерывистыми кварцевыми жилами и зонами окварцованных гематит-серицит-кварцевых пород. Руды состоят на 90-95% из кварца и 3-5% сульфидов; текстура руд массивная, вкрапленная структура зернистая, колломорфная; объемный вес 2,6. Золото содержится в количестве от следов до 163,3 г/т, в виде мелких 0,1-1,5, редко до 2 мм вкраплений неправильной, реже пластинчатой формы в кварце, сульфиды и гидроокислы железа.

М-ние III группы классификации.

Техническое и бытовое водоснабжение возможно из р. Майбулак, протекающей в 4 км от объекта.

Руды предполагается перерабатывать в качестве флюсов на металлургических заводах. Возможен прирост запасов в количестве 800 кг за счет разведки более глубоких горизонтов жил 1, 1а, 3б жилы участка Новый II.



-  - контур месторождения – Майбулак Восточный
-  - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.

Вид полезного ископаемого	Балансовые запасы		Забалансовые запасы
Золото	A+B+C1 – 306 кг.	C2 – 419 кг.	

Месторождение Северо-Леонидовское

Костанайская область

41

Местоположение: Месторождение Северо-Леонидовское расположено в Денисовском районе Костанайской области.


Краткая геологическая характеристика: Северо-Леонидовское рудопроявление было выявлено при проведении геолого-съёмочных работ масштаба 1:50 000 листов N-41-III-A, Б (В.И. Максименко и др., 1976). В 1976-79 гг. в результате обобщения геолого-геохимических и геофизических материалов в масштабе 1:200 000 была выделена Жанаталапская перспективная площадь на поиски золота (В.Я. Климов и др.). В 1980-84 гг. были проведены общие поисковые работы на золото в пределах Жанаталапской золотоперспективной площади, по результатам работ выявлены и рекомендованы к дальнейшему изучению золотоперспективные зоны Северо-Леонидовского участка (В.М. Тищенко и др., 1984 г). Подсчет запасов окисленных руд выполнен по временным (оценочным) кондициям, параметры которых приняты по аналогии с подобными месторождениями Казахстана, и в целом подтверждены технико-экономическими расчетами (ТЭР) о возможном промышленном значении Северо-Леонидовского месторождения. Параметры кондиций, рекомендуемые авторами для подсчета запасов окисленных руд для условий открытой отработки, следующие:

- бортовое содержание золота в пробе для оконтуривания балансовых запасов руды - 0,3 г/т;
- минимальная пересеченная промышленная мощность рудных тел, включаемых в подсчет запасов - 1,0 г/т, при меньшей мощности, но высоком содержании золота руководствоваться соответствующим метрограммом;
- максимальная мощность прослоев пустых пород и некондиционных руд – 3,0м.

Оценка прогнозных ресурсов золота в коренных образованиях Северо-Леонидовского месторождения произведена на основании анализа материалов глубоких поисковых и поисково-оценочных колонковых скважин. Прогнозные ресурсы оценены по категории Р1 до глубины 170 м рудных тел 1-3, 5, 9, 11, 17, 23 и составляют 3,3 млн.т руды и 3 698 кг золота при среднем содержании – 1,12 г/т.

Укрупненный ТЭР показателей отработки запасов окисленных руд Северо-Леонидовского месторождения свидетельствуют о возможности эффективной работы будущего предприятия.

Месторождение: ТОО «Ахсуал», на основании лиц.№-729-EL от 06.08.20г.



-  - контур месторождения – Северо-Леонидовское
-  - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.			
Вид полезного ископаемого	Балансовые запасы		Забалансовые запасы
Золото		C2 –1004 кг.	

Местоположение: Месторождение участок Шаханский расположен в промышленно развитом Черубайнуринском угленосном районе Карагандинского угольного бассейна.

Краткая геологическая характеристика: В 1970-1972гг. в соответствии с заданиями комбината "Карагандауголь" в пределах полей шахт «Шаханская», «Степная» и «Молодежная» была проведена доразведка пластов Д8 – Д6.

Все пробуренные на участках скважины располагаются на разведочных профилях, ориентированных преимущественно вкост простирания угленосной толщи. Бурение разведочных скважин производилось станками ЗИФ-650А и ЗИФ 1200А. Отложения аллювия, неогена и палеогена проходились диаметрами 152-131 мм и обсаживались трубами диаметром 146/137 и 127/118 мм до глубины 15-70 м. В отложениях карбона при бурении в основном применялся диаметр 92 мм. Угольные пласты прорезались одинарными и двойными колонковыми трубами систем Дайнеко И.И. и Куликова И.Ф. Средний выход угольного керна на полях шахт «Шаханская», «Степная», «Молодежная» составляет 62%.


Шахта «Шаханская»

Поле вытянуто меридианально по простиранию пластов на 5,5 км. Ширина поля 1,6-1,7 км. На западе шахта «Шаханская» граничит с шахтой «Степная» по взбросу 1, на юге с шахтой «Молодежная» – по взбросам 30 и 30а.

Из 22 разрывных нарушений, выявленных геологической разведкой, 18 сосредоточено в северной и северо-восточной частях и только четыре на юге. В северной части поля, наиболее крупные как по протяженности, так и по амплитудам нарушения, имеют характер несогласных взбросов. Остальные нарушения, протяженностью не более 1 км являются согласными взбросами и сбросами. Почти все нарушения имеют простирание, согласное с простиранием пород. Дизъюнктивными нарушениями поле шахты разделено на пять обособленных блоков: 1 – центральный, 2 – западный, 3 – северо-восточный, 4 – восточный и 5 – юго-восточный.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.

Вид полезного ископаемого	Балансовые запасы		Забалансовые запасы
Уголь		С2 – 1133 тыс.т.	



 - отозванный контракт ТОО «Шахан Комир», месторождение выходы угольного пласта Д6 на участках «Молодежный», «Степной», «Шаханский», **Участок Шаханский** (уголь). Контракт № 4321 от 25.07.2016 г. на добычу (отозван в 2020 г., акт обследования в Обществе отсутствует)

 - лицензии на ГИН

 - населенный пункт и буферная зона


Месторождение Березовское

Акмолинская и Северо-Казахстанская области

43

Местоположение: 60 км к северо-западу от г. Кокшетау в Северо-Казахстанской области. Ближайшая ж.-д. станция Азат находится в 45 км к востоку от месторождения.

Краткая геологическая характеристика: Чеганские отложения, заключающие продуктивные пески, залегают на неровной поверхности размытой коры выветривания. Рудовмещающие пески представлены хорошо сортированными мелко- и тонкозернистыми разностями. В пределах разведанной площади выделены две рудоносные залежи песков - Верхняя и Нижняя, а также ряд отдельных линз. Полезными минералами являются ильменит, рутил и циркон. Кварц составляет 85% от всей массы песков. Месторождение характеризуется повышенным содержанием циркона. Месторождение изучено скважинами по сети 800x400 и 400x200 м, на юго-востоке 1600x400 м. Верхняя рудоносная залежь прослежена по простирацию в северо-западном направлении на 5,8 км при ширине от 0,8 до 1,5 км. Мощность колеблется от 0,5 до 2,5 м, глубина залегания - от 2,5 до 9,0 м. Нижняя залежь расположена в южной части площади, прослежена на 2,2 км при ширине от 0,4 до 0,7 км. Отдельные линзы вскрыты скважинами, имеют размеры, не превышающие 0,2x0,4 км. Пески чеганской свиты обводнены, воды безнапорные, залегают на глубине от 9 до 15 м. Дебиты по скважинам от 0,1 до 1,6 л/сек, при понижениях 1,6-6,3 м. Водопритоки в карьер оценивались в 21,4 м³/час.



- контур месторождения Березовское
- отозванный контракт ТОО «ГПК Горизонт», месторождение Березовское (золото). Контракт № 2720 от 21.07.2008 г. на разведку (отозван в 2022г., имеется акт обследования от 04.07.2024 г., территория не принята, нужна ликвидация)
- лицензия на ГИН


Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	A+B+C1 – 221,04 кг, C2 – 64,81 кг.	-
серебро	A+B+C1 – 11,64 тонн, C2 – 1,17 тонн	-
свинец	A+B+C1 – 0,36 тыс.т, C2 – 0,00 тыс.т	-
цинк	A+B+C1 – 1,77 тыс.т, C2 – 0,12 тыс.т	-

Местоположение: Месторождение в 100 км к СВ от ж/д станции Саяк, Аягозский район, абайская область.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к периферической части вулcano- тектонической структуры, осложненной кольцевыми разрывами и трещинами. Наиболее крупные кварцевые жилы и жилоподобные кварц-адуляр-серицитовые тела тяготеют к трещинам субмеридионального и широтного простирания. На площади около 1,8 км² обнаружено около 50 жил, жильных зон и жилообразных тел, которые имеют в плане дугообразные и кольцообразные формы. Выделено 6 промышленных рудных тел, оконтуренных по данным опробования среди трех жил №№ 1-3 северо-восточного и субмеридионального простирания, протяженность которых изменяется от 70 м (жила № 3) до 400 м (жила № 1). Протяженность рудных тел в пределах жильных зон изменяется от 13 до 92,5 м, средняя мощность рудных тел составляет от 1,0 до 3,5 м. Золото распределено весьма неравномерно и встречается в виде единичных зерен и скоплений в кварце.

Месторождение отрабатывалось комбинатом «Алтайзолото» карьерным способом в 1972-73 годах. Глубина отработки по первому рудному телу составляет 5-7 м.

Объект необходимо доизучать.



■ - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион, а также расторгнутая контрактная территория ТОО "ГРК "Sharyk" месторождение Шарык (Контракт №4243 от 16.07.2013 г. на разведку золота. Данные об Акте обследования/ликвидации в Обществе не имеется)

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.			
Вид полезного ископаемого	Балансовые запасы		Забалансовые запасы
Золото		C2 –501 кг.	

Месторождение Белогорское

Восточно-Казахстанская область

45

Местоположение: Месторождение Белогорское расположено в 108 км от Усть-Каменогорска, с последним оно связано дорогой с асфальтовым покрытием (80 км) до пос. Асу-Булак и далее (28 км) - с гравийным покрытием. Район экономически освоен.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение расположено в эндоконтакте Белогорского гранитного массива, ограниченного: не севере крупными разрывными нарушениями Первомайско-Белогорского разлома СЗ простирания; на ЮВ-серией разрывов Чебундинского разлома северо и северо-восточного направления.


Месторождение ограничено с севера и северо-востока осадочно-метаморфическими породами такырской свиты, с запада и ЮЗ дайками аплит-пегматитов. Редкометальное оруденение пространственно и генетически связано с жильной фазой гранитоидов калбинского комплекса (батолитовая формация).

Вмещающими породами для большинства рудных тел месторождения являются средне- и мелкозернистые биотитовые граниты, имеющие порфировидную структуру. На сев. фланге месторождения распространены осадочно-метаморфические породы Такырской свиты, представленные ороговикованными и песчанно-глинистыми сланцами в виде останцов и ксенолитов.

В вещественном составе руд принимают участие более 40 минералов, основные породообразующие минералы: альбит-30-75%, микроклин-25-40, кварц-15-30%, мусковит-1-11% и др. в небольших количествах, менее 1%. Основные из них: танталит-колумбит, касситерит, берилл, сподумен, петалит, поллуцит и др. Руды по физико-механическим свойствам относятся к крепким и устойчивым.

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.

Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
Бериллий	A+B+C1 – 1358 тонн, C2 – 341 тонн	2816 тонн
олово	A+B+C1 – 617 тонн, C2 – 157 тонн	502 тонн
тантал	A+B+C1 – 243 тонн, C2 – 42 тонн	299 тонн
ниобий	A+B+C1 – 244 тонн, C2 – 57 тонн	-




-  - контур месторождение **Белогорское**, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для дальнейшего выставления на аукцион
-  - контуры ТМО (Отвал скальный, Рудник Белая гора, номер паспорта № 192/1)
-  - населённый пункт и буферная зона населенного пункта - с. Белогорское

Местоположение: расположено Панфиловском районе в 20 км севернее автотрассы Алматы-Панфилов.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение находится в узле пересечения сквозного северо-восточного, локальных северо-западного и субширотного разломов. Рудное поле приурочено к опущенному блоку вулканитов среднего состава, прорванных малыми интрузивными телами пестрого состава (от габбро-диоритов до сиенито-гранитов) южно-джунгарского триасового комплекса. К последним пространственно тяготеют кварцевые жилы и зоны прожилкования. Вмещающие породы гидротермально изменены до вторичных кварцитов. Кварцевые жилы слабо золотоносны и промышленного интереса не представляют. Зоны прожилкового окварцевания являются золотоносными. Состав рудных тел: кварц, гематит, флюорит, золото, пирит, халькопирит, халькозин, кераргирит, вульфенит, церуссит, малахит, ярозит, барит, бисмоклитит.

Прослежено 4 рудных тела протяженностью от 20 до 70 м, мощностью от 0,6 до 2,7 м с содержанием золота от 3 до 63 г/т (среднее 6-7 г/т). Руда слабосеребристая (до 10 г/т).

Фланги и глубокие горизонты месторождения не изучены.



Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
золото	C1- 69 кг	-

-  - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Сеным), для дальнейшего выставления на аукцион
-  - населённый пункт и буферная зона населенного пункта - с.Ушкызыл
-  - лицензии на ГИН


Местоположение: Месторождение Сугатовское в 18 км к СЗ от ж/д станции Шемонаиха.

Краткая геологическая характеристика: Участок является крайней западной частью единой рудоносной полосы Сугатовка-Выдриха. Оруденение приурочено к узлам пересечения двух нарушений широтного и северо-восточного направлений и локализуется в эндоконтактовой части интрузивных плагиогранит-порфиров с породами таловской свиты. Рудное тело штокообразной формы сужается внизу и выклинивается на глубине 102 м, средняя протяженность штока 120 м, средняя ширина – 80 м, средняя мощность 35 м.

Зона окисления развита до глубины 45-50 м, руды зоны окисления отработаны. Зона вторичного сульфидного обогащения встречена на глубине 40-47 м, мощность ее составляла 1,5-2,5 м.

Выявленные геохимические ореолы на площади участка имеют надрудный характер и указывают на возможность наличия кулисообразно расположенных рудных тел с общим погружением на северо-запад. С целью наращивания запасов необходимо бурение на северном и восточном флангах рудопроявления.

Месторождение: ТОО СП Аксу Золото, на основании контракта К-4416 от 25.07.16г.



-  - контур месторождения Сугатовское, включенная в ПУГФН на добычу ТПИ, для выставления на аукцион
-  - отозванный контракт ТОО «СП «Аксу Золото», месторождение Сугатовское (золото). Контракт № 5204 от 22.11.2017 г. на разведку (отозван в 2023г., акт обследования в Обществе отсутствует)
-  - контур месторождения – Сугатовское (ОПИ)
-  - лицензии на ГИН
-  - населенный пункт и буферная зона

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024 г.			
Вид полезного ископаемого	Балансовые запасы		Забалансовые запасы
Золото, кг		С2 –4145,00	