


Местоположение: в Мугоджарском районе Актюбинской области, в 700 м северо-западнее поселка Каинды на правом и левом берегах одноименной реки.

Краткая геологическая характеристика: Месторождение приурочено к средней части восточного крыла Карасайской антиклинали, сложенной аплитогнейсами, гранитогнейсами, биотитовыми гнейсами и графитистыми кварцитами ортокарасайской свиты докембрия. Простираение пород субмеридиональное, падение восточное под углом 60-80°. Отмечаются линзы пегматоидов и секущие дайки плагиогранит-порфиров. Широко развита кора выветривания мощностью первые метры. Кора перекрыта глинисто-песчанисто-щебенистыми отложениями четвертичного возраста мощностью 1-1,2м.

Выявлено шесть залежей асбестоносных гипербазитов, представленных оталькованными и антофиллитизированными метасульфидными. Размеры залежей 75 x 30 x 30 - 120 x 30 x 50 м. Форма залежей линзообразная, изометрично-округлая и трубообразная. Контакты с вмещающими породами четкие, извилистые. Руды звездчатой структуры, массивные, состоят из талька, волокнистого и жесткого антофиллита, карбоната и, в меньшей степени, актинолита, флогопита, вермикулита. Встречаются реликты серпентинита. Степень асбестизации увеличивается к висячему боку, а также к южному выклиниванию тел. Содержание волокна по залежам I и III класса +0,5 мм - 1,5-10%; по залежи II класса +0,5 мм - до 19,46%, +1,6 мм до 17,28%.



 - территория включенная в ПУГФН на добычу ТПИ (м-е Каиндинское), для дальнейшего выставления на аукцион

 - лицензии на ГИН

Выписка из государственного учета запасов по состоянию на 01.01.2024г.		
Полезный компонент	Балансовые запасы	Забалансовые запасы
асбест	A+B+C1- 6,4 тыс.т, C2 – 0,2 тыс.т	-